



Obiettivo: c) Miglioramento la competitività a medio e lungo termine
Intervento: b) Servizi di consulenza e assistenza tecnica Intervento

Reg UE 2021/2115 P.O. olio anno 2025

Bollettino Settimanale di Informazione FitoPatologica

Bollettino Fitopatologico n. 10

VALIDITA' DAL : 08/09/2025 AL : 14/09/2025

> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <

Comprensorio n° 2 RIZZICONI-PIZZO-SAN GREGORIO D'IPPONA-SAN CALOGERO-VIBO VALENTIA

> SITUAZIONE METEOROLOGICA

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE GENERALE:

Dopo un avvio di settembre un po' capriccioso e mite, il quadro meteorologico sta subendo un mutamento netto e repentino: il fine settimana segnerà l'arrivo di una vera e propria fiammata africana, capace di spingere le temperature ben oltre le medie tipiche del periodo, regalando giornate che sembreranno ancora pienamente estive. Si vivranno giornate caldissime per il periodo, con valori compresi tra i 34 e i 36°C, soprattutto nelle aree lontane dalle influenze marine (Fonte "il meteo")

Parassita: Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Stadio fenologico: Ingrossamento del frutto

RILIEVI DI CAMPO

01/09/2025-07/09/2025

Insetti catturati su trappola comprensorio	Media	Infestazione %	Soglia d'intervento %	
			Olive da Olio	Olive da Mensa
COMPENSORIO - VV - COLLINA VIBONESE	1	1	10	2

> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

Siamo entrati nella fase centrale dell'ingrossamento delle olive, un momento che segna il culmine di diversi mesi di cura e attenzioni dedicate alle piante. Le olive hanno ormai raggiunto circa il 70% delle loro dimensioni finali. Presenza di cascola causata da *Phoma Dalmatica*.

* Si consiglia **IL MONITORAGGIO** delle drupe:

Le aziende che attuano la difesa con esche avvelenate a base di spinosad (max 8 applicazioni l'anno) o cyantraniliprole (rispettando i limiti di etichetta) devono ripetere il trattamento ogni 12-14 giorni, poiché il prodotto perde di efficacia. Le aziende che attuano il controllo della mosca con trappole a cattura massale devono controllare il corretto funzionamento degli attrattivi ormonali e alimentari.

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d'infestazione delle olive.

Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d'intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da tavola.

Per informazioni contattare: Dott. Manco Domenico tel. 3286173864

Lamezia Terme (CZ)

08/09/2025