



**Obiettivo: c) Miglioramento la competitività a medio e lungo termine  
Intervento: b) Servizi di consulenza e assistenza tecnica Intervento**

**Reg UE 2021/2115 P.O. olio anno 2025**

Bollettino Settimanale di Informazione FitoPatologica

**Bollettino Fitopatologico n. 13**

**VALIDITA' DAL :** 29/09/2025 **AL :** 05/10/2025

> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <

Comprensorio n° 1 LAMEZIA TERME- GIZZERIA-GIRIFALCO-SAN PIETRO A MAIDA-CORTALE-CURINGA-MAIDA- GIRIFALCO-SAN PIETRO LAMETINO SNC

**> SITUAZIONE METEOROLOGICA**

**SITUAZIONE ED EVOLUZIONE GENERALE:**

Settimana autunnale in arrivo. Una perturbazione aprirà la settimana portando un primo calo delle temperature e condizioni più fresche. Da metà settimana, un ciclone in arrivo dal Nord porterà instabilità e rovesci, soprattutto al Nord e Centro. Nel weekend, il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, in particolare lungo l'Adriatico, accompagnato da un ulteriore calo termico, con valori sotto la media stagionale. (Fonte: il Meteo.it)

**Parassita: Mosca delle olive (Bactrocera oleae)**

**Stadio fenologico: Invaiaura**

RILIEVI DI CAMPO		22/09/2025-28/09/2025		
Insetti catturati su trappola comprensorio	Media	Infestazione %	Soglia d'intervento %	
			Olive da Olio	Olive da Mensa
COMPENSORIO - CZ - LITORALE TIRRENICA	6	5	10	2

**> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO**

Si consiglia di effettuare eventuali trattamenti valutando attentamente i tempi di carenza e il periodo ottimale per la raccolta. Si ricorda, inoltre, di verificare le disposizioni dei propri disciplinari di produzione e di attenersi a quanto previsto nell'etichetta del prodotto che ricordiamo dovrà essere registrato per l'olivo.

**> CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Comprensorio n° 1)**

**Le aziende che attuano la difesa con esche avvelenate a base di spinosad (max 8 applicazioni l'anno) o cyantraniliprole (rispettando i limiti di etichetta) devono ripetere il trattamento ogni 12-14 giorni, poiché il prodotto perde di efficacia. Le aziende che attuano il controllo della mosca con trappole a cattura massale devono controllare il corretto Funzionamento degli attrattivi ormonali e alimentari.**

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d'infestazione delle olive.  
**Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d'intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da**

Per informazioni contattare: Dott.ssa Pamela Simonetta tel. 3492423345

Lamezia Terme (CZ) 29/09/2025