Obiettivo: c) Miglioramento la competitività a medio e lungo termine
Intervento: b) Servizi di consulenza e assistenza tecnica Intervento

Reg UE 2021/2115 P.O. olio anno 2025

Bollettino Settimanale di Informazione FitoPatologica

Bollettino Fitopatologico n.	**5**

VALIDITA' DAL :	**11/08/2025**	**AL :**	**17/08/2025**

> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <

Comprensorio n° 1	LAMEZIA TERME- GIZZERIA-GIRIFALCO-SAN PIETRO A MAIDA-CORTALE-CURINGA-MAIDA- GIRIFALCO-SAN PIETRO LAMETINO SNC

> SITUAZIONE METEOROLOGICA

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE GENERALE:
Con il termine "canicola subtropicale" si indica un periodo di caldo intenso e prolungato, tipicamente associato all'arrivo di masse d'aria calda di origine subtropicale verso il bacino del Mediterraneo e l'Europa. Ed è proprio quello che ci aspettiamo in avvio della prossima settimana, quella di Ferragosto, quando, già da Lunedì 11 Agosto, una massa d'aria molto calda in arrivo dalle zone interne di Marocco e Algeria provocherà, oltre ad una maggiore stabilità atmosferica, con tanto sole, anche un'impennata delle temperature. (Fonte "il meteo")

Parassita: Mosca delle olive (Bactrocera oleae)

Stadio fenologico: Ingrossamento del frutto

RILIEVI DI CAMPO	**04/08/2025-10/08/2025**

Insetti catturati su trappola comprensorio		**Infestazione %**	**Soglia d'intervento %**	
	Media		Olive da Olio	Olive da Mensa
COMPRENSORIO - CZ - LITORALE TIRRENICA	0	0	10	2

> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

Siamo entrati nella fase centrale dell'ingrossamento delle olive, un momento che segna il culmine di diversi mesi di cura e attenzioni dedicate alle piante. Le olive hanno ormai raggiunto circa il 90% delle loro dimensioni finali

> CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Comprensorio n° 1)

* Si consiglia di **NON ESEGUIRE** i trattamenti antiparassitari contro la Mosca dell'ulivo:

Per chi intende utilizzare trappole per la cattura massale, e non ha ancora concluso la posa deve terminare al più presto, in quanto possono ridurre significativamente la popolazione di mosche adulte, diminuendo così il potenziale di ovideposizione e i danni ai frutti. In alternativa alle trappole per la cattura massale è possibile utilizzare le esche proteiche secondo etichetta.

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d'infestazione delle olive.
Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d'intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da

Per informazioni contattare: Dott.ssa Pamela Simonetta tel. 3492423345

Lamezia Terme (CZ) 11/08/2025

Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell' Italia