



Obiettivo: c) Miglioramento la competitività a medio e lungo termine
Intervento: b) Servizi di consulenza e assistenza tecnica Intervento

Reg UE 2021/2115 P.O. olio anno 2025

Bollettino Settimanale di Informazione FitoPatologica

Bollettino Fitopatologico n. 9

VALIDITA' DAL :	01/09/2025	AL :	07/09/2025
-----------------	------------	------	------------

> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <

Comprensorio n° 2	RIZZICONI-PIZZO-SAN GREGORIO D'IPPONA-SAN CALOGERO-VIBO VALENTIA
-------------------	--

> SITUAZIONE METEOROLOGICA

"SITUAZIONE ED EVOLUZIONE GENERALE:

Periodo caratterizzato dal transito di una perturbazione e successiva rimonta dell'alta pressione. Successivamente rimonta l'anticiclone a garanzia di condizioni di bel tempo con sole prevalente e temperature in generale aumento. Clima estivo al Centro-Sud per fine settimana con picchi di 32-33°C (Fonte "il meteo")

Parassita: Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Stadio fenologico: Ingrossamento del frutto

RILIEVI DI CAMPO	25/08/2025-31/08/2025
------------------	-----------------------

Insetti catturati su trappola comprensorio	Media	Infestazione %	Soglia d'intervento %	
			Olive da Olio	Olive da Mensa
COMPENSORIO - VV - COLLINA VIBONESE	2	1	10	2

> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

Siamo entrati nella fase centrale dell'ingrossamento delle olive, un momento che segna il culmine di diversi mesi di cura e attenzioni dedicate alle piante. Le olive hanno ormai raggiunto circa il 70% delle loro dimensioni finali. Presenza di cascola causata da *Phoma Dalmatica*.

* Si consiglia di **NON ESEGUIRE** i trattamenti antiparassitari contro la Mosca dell'ulivo:

Le aziende che attuano la difesa con esche avvelenate a base di spinosad (max 8 applicazioni l'anno) o cyantraniliprole (rispettando i limiti di etichetta) devono ripetere il trattamento ogni 12-14 giorni, poiché il prodotto perde di efficacia. Le aziende che attuano il controllo della mosca con trappole a cattura massale devono controllare il corretto funzionamento degli attrattivi ormonali e alimentari.

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d'infestazione delle olive.
Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d'intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da tavola.

Per informazioni contattare: Dott. Manco Domenico tel. 3286173864

Lamezia Terme (CZ) 01/09/2025