


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 05

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

20/07/2026 - 26/07/2026



**COMPENSORIO - VV - COLLINA
VIBONESE**

FILADELFIA
FRANCICA
LIMBADI
MAIERATO
MILETO
PIZZONI
ROMBIOLO
SAN CALOGERO
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN GREGORIO D IPPONA

SAN NICOLA DA CRISSA
SANT ONOFRIO
SORIANO CALABRO
STEFANACONI
VALLELONGA
VAZZANO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	62	3	10%	STAZIONARIO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
20/07/2026	21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026	25/07/2026	26/07/2026

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): rilevato un leggero incremento della presenza di adulti nelle trappole da monitoraggio. Le temperature attuali, superiori ai 40°C - in tutti i comprensori, possono condizionare la vitalità del fitofago riducendo la fertilità delle femmine, mortalità delle uova e delle larve. Allo stato attuale il trattamento chimico è consigliato per le sole varietà a drupa grossa. La strategia di difesa contro il fitofago consiste nell'utilizzo di prodotti registrati per la tignola dell'olivo ed inoltre, le aziende devono attenersi scrupolosamente al metodo di coltivazione adottato. Si consiglia di eseguire i trattamenti al mattino o al tardo pomeriggio con temperature comprese tra 30 e 32 °C.

N.B. da disciplinare di agricoltura integrata, l'intervento chimico è giustificato solo per la generazione carpogaga per un max di 1 trattamento. I prodotti ammessi da disciplinare sono: *Bacillus thuringiensis*, *Spinetoram* e *Acetamiprid*.

Tecnici di riferimento Dott.ssa Simonetta Pamela, Dott. ssa Giardino Angela 096827437 e Dott. Domenico Manco 3286173864